

Averol®

VIA ORAL USO VETERINÁRIO

ANTIMICROBIANO À BASE DE SULFADIMETOXINA PARA AVES.

FÓRMULA:

Cada 100 g contém:

Sulfadimetoxina.....5,0 g

Cloreto de colina 50%.....1,0 g

Azul de metileno..... 0,1g

Veículo q.s.p.100 g

MECANISMO DE AÇÃO:

A **sulfadimetoxina** é uma sulfonamida de ação longa, rapidamente absorvida. É um análogo estrutural do PABA e inibe competitivamente a síntese do ácido fólico, resultando na supressão da síntese de proteínas, diminuição dos processos metabólicos, e inibição do crescimento e multiplicação bacteriana

INDICAÇÕES:

AVEROL é indicado no tratamento das diarreias das aves, cólera e coriza aviária provocada por agentes gram-positivos (*Staphylococcus* e *Streptococcus*) e gram-negativos (*E.coli*, *Salmonella* e *Pasteurella*) sensíveis à sulfadimetoxina.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

AVEROL deve ser administrado diluído em água através do bebedouro ou via oral diretamente no bico do animal, conforme orientações abaixo:

TABELA DE DOSAGENS

MODO DE USAR	QUANTIDADE (água)	DOSAGEM (Averol)
BEBEDOURO (água potável)	100 mL	0,5 a 1,0 g
	500 mL	2,5 a 5,0 g
	1 Litro	5,0 a 10,0 g

DIARREIA, CÓLERA E CORIZA AVIÁRIA

1º dia de tratamento: diluir de 5 a 10 g do produto em 1 litro de água.

2º ao 4º dia de tratamento: diluir 5 g do produto em 1 litro de água.

COCCIDIOSE:

Diluir de 5 a 10 g de Averol em 1 (um) litro de água.

Tratar durante 5 a 7 dias. Realizar intervalo de 5 dias e repetir o tratamento de acordo com o critério do Médico Veterinário.

Caso seja necessário tratar diretamente no bico do animal, administrar 2 gotas do produto para cada 20g de peso vivo. Para tanto, o produto precisa ser diluído, de acordo com a tabela abaixo:

QUANTIDADE (Averol)	QUANTIDADE (Água)
1g	5mL

COCCIDIOSE

Administrar 1 gota da diluição para cada 20g de peso corpóreo.

DIARREIA, CÓLERA E CORIZA AVIÁRIA

Administrar 2 gotas da diluição para cada 20 g de peso corpóreo.

Manter o tratamento por período de tempo não inferior a 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

Alterações na posologia, modo de usar e tempo de tratamento ficam à critério do Médico veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES:

AVEROL não apresenta contraindicações nas doses indicadas nesta bula.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

AVES

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 06 DIAS APOS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

APRESENTAÇÃO:

Frasco contendo 50g e 100g, e embalagens plásticas contendo 1 kg.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 3.320

em 26/01/1990.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto – CRF/SP n° 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Syntec do Brasil Ltda.

Estrada Rosa Scarpa, 178 – Votuparim

Santana de Parnaíba / SP

CEP: 06513-010

CNPJ: 02.177.011/0001-77

INDÚSTRIA BRASILEIRA



(11) 4702-5425
sac@syntec.com.br
www.syntec.com.br

